

Верхняя оценка наилучшей точности восстановления производных по значениям функций смешанной гладкости из классов Бесова

С. Н. Кудрявцев

Аннотация

В работе установлена оценка сверху величины наилучшей точности восстановления производных по значениям функций в заданном числе точек для классов Бесова функций, удовлетворяющих смешанным условиям Гёльдера. Эта оценка в некоторых случаях является более сильной, чем соответствующая оценка, полученная автором ранее в рассматриваемой задаче.

Ключевые слова: точность, восстановление, производная, значения функций, смешанная гладкость

Введение

В работе при соответствующих условиях на $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, $d \in \mathbb{N}$, установлена оценка сверху величины наилучшей точности восстановления в пространстве $L_q(I^d)$, $1 \leq q \leq \infty$, производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из классов Бесова $\mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq \theta \leq \infty$.

Настоящая работа продолжает исследования, проводившиеся автором в [1] – [4] для упомянутой задачи в отношении различных классов функций конечной гладкости.

Отметим, что средства, использовавшиеся в [1] – [3] для получения как верхних, так и нижних оценок указанной выше величины для рассматривавшихся в этих работах классов функций, неприменимы в отношении классов, изучаемых в [4] и настоящей статье. Помимо этого, схемы, применявшиеся в [1] – [3] для вывода верхних оценок точности приближений производных функций из исследуемых в [1] – [3] классов, оказались непригодными для изучаемых в [4] и настоящей работе классов. Предложенные в [4] средства и схемы вывода оценок позволили найти при определённых условиях слабую асимптотику отмеченной

выше величины для классов Никольского и Бесова функций, удовлетворяющих смешанным условиям Гёльдера. Используя эти средства и применяя новые технические приемы вывода, в настоящей работе получена в некоторых случаях более сильная оценка сверху рассматриваемой здесь величины для таких классов функций. Работа состоит из введения и двух параграфов, в первом из которых излагаются предварительные сведения, а во втором – основные результаты.

В заключение в качестве иллюстрации приведём полученный в §2 результат, касающийся величины наилучшей точности восстановления в $L_q(I^d)$ производных $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из класса Бесова $\mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$, определяемой равенством

$$\sigma_n(\mathcal{D}^\lambda, \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d), L_q(I^d)) = \inf_{A, \phi} \sup_{f \in \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)} \|\mathcal{D}^\lambda f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(I^d)},$$

где $\inf$ берётся по всем отображениям $A : \mathbb{R}^n \mapsto L_q(I^d)$ и отображениям $\phi : C(I^d) \mapsto \mathbb{R}^n$ вида $\phi(f) = (f(x^1), \dots, f(x^n))$, $x^j \in I^d$, $j = 1, \dots, n$. Для $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq \theta, q \leq \infty$ установлено, что при $\alpha_j - p^{-1} > 0$, $\alpha_j - \lambda_j - (p^{-1} - q^{-1})_+ > 0$, $j = 1, \dots, d$, справедливо неравенство

$$\sigma_n(\mathcal{D}^\lambda, \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d), L_q(I^d)) \leq c_1 n^{-\mathfrak{m}} (\log n)^{(\mathfrak{m}+1-1/\max(p,\theta))(\mathfrak{c}-1)},$$

где

$$\begin{aligned} \mathfrak{m} &= \min\{\alpha_j - \lambda_j - (p^{-1} - q^{-1})_+ : j = 1, \dots, d\}, \\ \mathfrak{c} &= \text{card}\{j = 1, \dots, d : \alpha_j - \lambda_j - (p^{-1} - q^{-1})_+ = \mathfrak{m}\}, \end{aligned}$$

c_1 – положительная константа, не зависящая от n . Отметим, что в аналогичной оценке из [4] слагаемое $-1/\max(p, \theta)$ в показателе степени $\log n$ отсутствует.

§1. Предварительные сведения и вспомогательные утверждения

1.1. В этом пункте вводятся обозначения, относящиеся к функциональным классам и пространствам, рассматриваемым в настоящей работе, а также приводятся некоторые факты, необходимые

в дальнейшем.

Для $d \in \mathbb{N}$ через $\mathbb{Z}_+^d$ обозначим множество

$$\mathbb{Z}_+^d = \{\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_d) \in \mathbb{Z}^d : \lambda_j \geq 0, j = 1, \dots, d\}.$$

Обозначим также при $d \in \mathbb{N}$ для $l \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathbb{Z}_+^d(l)$ множество

$$\mathbb{Z}_+^d(l) = \{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d : \lambda_j \leq l_j, j = 1, \dots, d\}.$$

Для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathcal{P}^{d,l}$ будем обозначать пространство вещественных полиномов, состоящее из всех функций $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ вида

$$f(x) = \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)} a_\lambda \cdot x^\lambda, x \in \mathbb{R}^d,$$

где $a_\lambda \in \mathbb{R}, x^\lambda = x_1^{\lambda_1} \dots x_d^{\lambda_d}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$.

При $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$ для области $D \subset \mathbb{R}^d$ через $\mathcal{P}^{d,l}(D)$ обозначим пространство функций f , определённых в D , для каждой из которых существует полином $g \in \mathcal{P}^{d,l}$ такой, что сужение $g|_D = f$.

Для топологического пространства T через $C(T)$ обозначим пространство непрерывных вещественных функций, заданных на T . Если T – компактное топологическое пространство, то в $C(T)$ фиксируем норму, определяемую равенством

$$\|f\|_{C(T)} = \max_{x \in T} |f(x)| = \sup_{x \in T} |f(x)|, f \in C(T).$$

Для измеримого по Лебегу множества $D \subset \mathbb{R}^d$ при $1 \leq p \leq \infty$ через $L_p(D)$, как обычно, обозначается пространство всех вещественных измеримых на D функций f , для которых определена норма

$$\|f\|_{L_p(D)} = \begin{cases} (\int_D |f(x)|^p dx)^{1/p}, 1 \leq p < \infty; \\ \sup \text{vrai}_{x \in D} |f(x)|, p = \infty. \end{cases}$$

Введём ещё следующие обозначения.

Для $x, y \in \mathbb{R}^d$ положим $xy = x \cdot y = (x_1 y_1, \dots, x_d y_d)$, а для $x \in \mathbb{R}^d$ и $A \subset \mathbb{R}^d$ определим

$$xA = x \cdot A = \{xy : y \in A\}.$$

Для $x \in \mathbb{R}^d : x_j \neq 0$, при $j = 1, \dots, d$, положим $x^{-1} = (x_1^{-1}, \dots, x_d^{-1})$.

При $d \in \mathbb{N}$ для $x, y \in \mathbb{R}^d$ будем обозначать

$$(x, y) = \sum_{j=1}^d x_j y_j.$$

Обозначим через $\mathbb{R}_+^d$ множество $x \in \mathbb{R}^d$, для которых $x_j > 0$ при $j = 1, \dots, d$, и для $a \in \mathbb{R}_+^d, x \in \mathbb{R}^d$ положим $a^x = a_1^{x_1} \dots a_d^{x_d}$.

При $d \in \mathbb{N}$ определим множества

$$\begin{aligned} I^d &= \{x \in \mathbb{R}^d : 0 < x_j < 1, j = 1, \dots, d\}, \\ \bar{I}^d &= \{x \in \mathbb{R}^d : 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, d\}, \\ B^d &= \{x \in \mathbb{R}^d : -1 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, d\}. \end{aligned}$$

Через $\mathbf{e}$ будем обозначать вектор в $\mathbb{R}^d$, задаваемый равенством $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)$.

Далее, напомним, что для области $D \subset \mathbb{R}^d$ и вектора $h \in \mathbb{R}^d$ через D_h обозначается множество

$$D_h = \{x \in D : x + th \in D \forall t \in \bar{I}\}.$$

Для функции f , заданной в области $D \subset \mathbb{R}^d$, и вектора $h \in \mathbb{R}^d$ определим в D_h её разность $\Delta_h f$ с шагом h , полагая

$$(\Delta_h f)(x) = f(x + h) - f(x), x \in D_h,$$

а для $l \in \mathbb{N} : l \geq 2$, в D_{lh} определим l -ую разность $\Delta_h^l f$ функции f с шагом h равенством

$$(\Delta_h^l f)(x) = (\Delta_h(\Delta_h^{l-1} f))(x), x \in D_{lh},$$

положим также $\Delta_h^0 f = f$.

Как известно, справедливо равенство

$$(\Delta_h^l f)(\cdot) = \sum_{k=0}^l C_l^k (-1)^{l-k} f(\cdot + kh), C_l^k = l! / (k!(l-k)!).$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $j = 1, \dots, d$ через e_j будем обозначать вектор $e_j = (0, \dots, 0, 1_j, 0, \dots, 0)$.

Лемма 1.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$. Тогда для любого $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ для $Q = x^0 + \delta I^d$ существует единственный линейный оператор $\mathbf{P}_{\delta, x^0}^{d, l} : L_1(Q) \mapsto \mathcal{P}^{d, l}$, обладающий следующими свойствами:

1) для $f \in \mathcal{P}^{d, l}$ имеет место равенство

$$\mathbf{P}_{\delta, x^0}^{d, l}(f | Q) = f,$$

2)

$$\ker \mathbf{P}_{\delta, x^0}^{d, l} = \left\{ f \in L_1(Q) : \int_Q f(x) g(x) dx = 0 \forall g \in \mathcal{P}^{d, l} \right\},$$

причём, существуют константы $c_1(d, l) > 0$ и $c_2(d, l) > 0$ такие, что
 3) при $1 \leq p \leq \infty$ для $f \in L_p(Q)$ справедливо неравенство

$$\|P_{\delta, x^0}^{d, l} f\|_{L_p(Q)} \leq c_1 \|f\|_{L_p(Q)},$$

4) при $1 \leq p < \infty$ для $f \in L_p(Q)$ выполняется неравенство

$$\|f - P_{\delta, x^0}^{d, l} f\|_{L_p(Q)} \leq c_2 \sum_{j=1}^d \delta_j^{-1/p} \left(\int_{\delta_j B^1} \int_{Q_{(l_j+1)\xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j+1} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}.$$

Доказательство леммы 1.1.1 приведено в [5].

При $d \in \mathbb{N}$ для $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathcal{D}^\lambda$ будем обозначать оператор дифференцирования $\mathcal{D}^\lambda = \frac{\mathcal{D}^{|\lambda|}}{\mathcal{D}x_1^{\lambda_1} \dots \mathcal{D}x_d^{\lambda_d}}$, где $|\lambda| = \sum_{j=1}^d \lambda_j$.

В [3] содержится

Лемма 1.1.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l), 1 \leq p, q \leq \infty, \rho, \sigma \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда существует константа $c_3(d, l, \lambda, \rho, \sigma) > 0$ такая, что для любых измеримых по Лебегу множеств $D, Q \subset \mathbb{R}^d$, для которых можно найти $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ такие, что $D \subset (x^0 + \rho\delta B^d)$ и $(x^0 + \sigma\delta I^d) \subset Q$, для любого полинома $f \in \mathcal{P}^{d, l}$ выполняется неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} \leq c_3 \delta^{-\lambda - p^{-1}\epsilon + q^{-1}\epsilon} \|f\|_{L_p(Q)}. \quad (1.1.1)$$

Теперь определим классы функций, изучаемые в настоящей работе (см. [6], [7]). Но прежде введём некоторые обозначения.

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ через $\mathbf{s}(x)$ обозначим множество $\mathbf{s}(x) = \{j = 1, \dots, d : x_j \neq 0\}$, а для множества $J \subset \{1, \dots, d\}$ через χ_J обозначим вектор из $\mathbb{R}^d$ с компонентами

$$(\chi_J)_j = \begin{cases} 1, & \text{для } j \in J; \\ 0, & \text{для } j \in (\{1, \dots, d\} \setminus J). \end{cases}$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ и $J = \{j_1, \dots, j_k\} \subset \mathbb{N} : 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq d$, через x^J обозначим вектор $x^J = (x_{j_1}, \dots, x_{j_k}) \in \mathbb{R}^k$, а для множества $A \subset \mathbb{R}^d$ положим $A^J = \{x^J : x \in A\}$.

Для области $D \subset \mathbb{R}^d$ и векторов $h \in \mathbb{R}^d$ и $l \in \mathbb{Z}_+^d$ через D_h^l обозначим множество

$$\begin{aligned} D_h^l &= (\dots (D_{l_d h_d e_d})_{l_{d-1} h_{d-1} e_{d-1}} \dots)_{l_1 h_1 e_1} = \{x \in D : x + t l h \in D \forall t \in \bar{I}^d\} \\ &= \{x \in D : (x + \sum_{j \in \mathbf{s}(l)} t_j l_j h_j e_j) \in D \forall t^{\mathbf{s}(l)} \in (\bar{I}^d)^{\mathbf{s}(l)}\}. \end{aligned}$$

Пусть $d \in \mathbb{N}$, D – область в $\mathbb{R}^d$ и $1 \leq p \leq \infty$. Тогда для $f \in L_p(D)$, $h \in \mathbb{R}^d$ и $l \in \mathbb{Z}_+^d$ определим в D_h^l смешанную разность функции f порядка l , соответствующую вектору h , равенством

$$\begin{aligned} (\Delta_h^l f)(x) &= ((\prod_{j=1}^d \Delta_{h_j e_j}^{l_j}) f)(x) = ((\prod_{j \in s(l)} \Delta_{h_j e_j}^{l_j}) f)(x) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^d(l)} (-\mathfrak{e})^{l-k} C_l^k f(x + kh), \quad x \in D_h^l, \end{aligned}$$

где $C_l^k = \prod_{j=1}^d C_{l_j}^{k_j}$, $k \in \mathbb{Z}_+^d(l)$.

Имея в виду, что для $f \in L_p(D)$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$ и векторов $h, h' \in \mathbb{R}^d : h^{s(l)} = (h')^{s(l)}$, соблюдается соотношение

$$\|\Delta_h^l f\|_{L_p(D_h^l)} = \|\Delta_{h'}^l f\|_{L_p(D_{h'}^l)},$$

определим для функции f смешанный модуль непрерывности в $L_p(D)$ порядка l равенством

$$\Omega^l(f, t^{s(l)})_{L_p(D)} = \sup_{\{h \in \mathbb{R}^d : h^{s(l)} \in t^{s(l)}(B^d)^{s(l)}\}} \text{vrai} \|\Delta_h^l f\|_{L_p(D_h^l)}, \quad t^{s(l)} \in (\mathbb{R}_+^d)^{s(l)}.$$

Пусть теперь $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $1 \leq p \leq \infty$ и D – область в $\mathbb{R}^d$. Тогда зададим вектор $l = l(\alpha) \in \mathbb{N}^d$, полагая $l_j = \min\{m \in \mathbb{N} : \alpha_j < m\}$, $j = 1, \dots, d$, и обозначим через $S_p^\alpha H(D)(\mathcal{S}_p^\alpha \mathcal{H}(D))$ множество всех функций $f \in L_p(D)$, обладающих тем свойством, что для любого непустого множества $J \subset \{1, \dots, d\}$ выполняется неравенство

$$\sup_{t^J \in (\mathbb{R}_+^d)^J} (t^J)^{-\alpha^J} \Omega^{l_{\chi J}}(f, t^J)_{L_p(D)} = \sup_{t^J \in (\mathbb{R}_+^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-\alpha_j} \right) \Omega^{l_{\chi J}}(f, t^{s(l_{\chi J})})_{L_p(D)} < \infty (\leq 1).$$

Пусть α, p, D и $l = l(\alpha)$ – те же, что и выше, и $\theta \in \mathbb{R} : 1 \leq \theta < \infty$. Тогда обозначим через $S_{p,\theta}^\alpha B(D)(\mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(D))$ множество всех функций $f \in L_p(D)$, которые для любого непустого множества $J \subset \{1, \dots, d\}$ удовлетворяют условию

$$\begin{aligned} &\left(\int_{(\mathbb{R}_+^d)^J} (t^J)^{-\alpha^J - \theta \alpha^J} (\Omega^{l_{\chi J}}(f, t^J)_{L_p(D)})^\theta dt^J \right)^{1/\theta} \\ &= \left(\int_{(\mathbb{R}_+^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-1-\theta \alpha_j} \right) (\Omega^{l_{\chi J}}(f, t^{s(l_{\chi J})})_{L_p(D)})^\theta \prod_{j \in J} dt_j \right)^{1/\theta} < \infty (\leq 1). \end{aligned}$$

При $\theta = \infty$ положим $S_{p,\infty}^\alpha B(D) = S_p^\alpha H(D)$, $S_{p,\infty}^\alpha \mathcal{B}(D) = S_p^\alpha \mathcal{H}(D)$.
Как известно (см., например, [4]), имеет место включение

$$S_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(D) \subset c_4(\alpha) S_p^\alpha \mathcal{H}(D),$$

где $c_4(\alpha) = \prod_{j=1}^d 2^{1+\alpha_j}$.

В заключение этого пункта введём ещё несколько обозначений.

Для банахова пространства X (над $\mathbb{R}$) обозначим $B(X) = \{x \in X : \|x\|_X \leq 1\}$.

Для банаховых пространств X, Y через $\mathcal{B}(X, Y)$ обозначим банахово пространство, состоящее из непрерывных линейных операторов $T : X \mapsto Y$, с нормой

$$\|T\|_{\mathcal{B}(X,Y)} = \sup_{x \in B(X)} \|Tx\|_Y.$$

Отметим, что если $X = Y$, то $\mathcal{B}(X, Y)$ является банаховой алгеброй.

1.2. В этом пункте содержатся сведения о кратных рядах, которыми будем пользоваться в дальнейшем.

Для $d \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{R}^d$ положим

$$\mathbf{m}(y) = \min_{j=1,\dots,d} y_j$$

и для банахова пространства X , вектора $x \in X$ и семейства $\{x_\kappa \in X, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$ будем писать $x = \lim_{\mathbf{m}(\kappa) \rightarrow \infty} x_\kappa$, если для любого $\epsilon > 0$ существует $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что для любого $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, для которого $\mathbf{m}(\kappa) > n_0$, справедливо неравенство $\|x - x_\kappa\|_X < \epsilon$.

Пусть X – банахово пространство, $d \in \mathbb{N}$ и $\{x_\kappa \in X, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$ – семейство векторов. Тогда под суммой ряда $\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} x_\kappa$ будем понимать вектор $x \in X$, для которого выполняется равенство $x = \lim_{\mathbf{m}(k) \rightarrow \infty} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d(k)} x_\kappa$.

При $d \in \mathbb{N}$ через Υ^d обозначим множество

$$\Upsilon^d = \{v \in \mathbb{Z}^d : v_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, d\}.$$

Имеет место

Лемма 1.2.1

Пусть X – банахово пространство, а вектор $x \in X$ и семейство $\{x_\kappa \in X, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$ таковы, что $x = \lim_{\mathbf{m}(\kappa) \rightarrow \infty} x_\kappa$. Тогда для семейства $\{\mathcal{X}_\kappa \in X, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$, определяемого равенством

$$\mathcal{X}_\kappa = \sum_{v \in \Upsilon^d : \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} (-\mathbf{e})^v x_{\kappa-v}, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d,$$

справедливо равенство

$$x = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{X}_\kappa.$$

Лемма является следствием того, что при $k \in \mathbb{Z}_+^d$ выполняется равенство

$$\sum |\kappa \in \mathbb{Z}_+^d(k) \mathcal{X}_\kappa = x_k \text{ (см. [5])}.$$

Замечание.

Легко заметить, что для любого семейства чисел $\{x_\kappa \in \mathbb{R} : x_\kappa \geq 0, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$, если ряд $\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} x_\kappa$ сходится, т.е. существует предел $\lim_{m(k) \rightarrow \infty} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d(k)} x_\kappa$, что эквивалентно соотношению $\sup_{k \in \mathbb{Z}_+^d} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d(k)} x_\kappa < \infty$,

то для любой последовательности подмножеств $\{Z_n \subset \mathbb{Z}_+^d, n \in \mathbb{Z}_+\}$, таких, что $\text{card } Z_n < \infty$, $Z_n \subset Z_{n+1}$, $n \in \mathbb{Z}_+$, и $\cup_{n \in \mathbb{Z}_+} Z_n = \mathbb{Z}_+^d$, справедливо равенство $\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} x_\kappa = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\kappa \in Z_n} x_\kappa = \sup_{k \in \mathbb{Z}_+^d} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d(k)} x_\kappa$. Отсюда несложно понять, что если для семейства векторов $\{x_\kappa \in X, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d\}$ банахова пространства X ряд $\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \|x_\kappa\|_X$ сходится, то для любой последовательности подмножеств $\{Z_n \subset \mathbb{Z}_+^d, n \in \mathbb{Z}_+\}$, таких, что $\text{card } Z_n < \infty$, $Z_n \subset Z_{n+1}$, $n \in \mathbb{Z}_+$, и $\cup_{n \in \mathbb{Z}_+} Z_n = \mathbb{Z}_+^d$, в X соблюдается равенство $\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} x_\kappa = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\kappa \in Z_n} x_\kappa$.

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ обозначим

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(x) &= \max_{j=1, \dots, d} x_j, \\ \mathfrak{C}(x) &= \text{card}\{j \in \{1, \dots, d\} : x_j = \mathfrak{M}(x)\}, \\ \mathfrak{c}(x) &= \text{card}\{j \in \{1, \dots, d\} : x_j = \mathfrak{m}(x)\}. \end{aligned}$$

Лемма 1.2.2

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\beta \in \mathbb{R}_+^d$, $\alpha \in \mathbb{R}^d$ и $\mathfrak{M}(\beta^{-1}\alpha) > 0$. Тогда существуют константы $c_1(d, \alpha, \beta) > 0$ и $c_2(d, \alpha, \beta) > 0$ такие, что для $r \in \mathbb{N}$ соблюдается неравенство

$$c_1 2^{\mathfrak{M}(\beta^{-1}\alpha)r} r^{\mathfrak{C}(\beta^{-1}\alpha)-1} \leq \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) \leq r} 2^{(\kappa, \alpha)} \leq c_2 2^{\mathfrak{M}(\beta^{-1}\alpha)r} r^{\mathfrak{C}(\beta^{-1}\alpha)-1}. \quad (1.2.1)$$

Лемма 1.2.3

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда существуют константы $c_3(d, \alpha, \beta) > 0$ и $c_4(d, \alpha, \beta) > 0$ такие, что при $r \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство

$$c_3 2^{-\mathfrak{m}(\beta^{-1}\alpha)r} r^{\mathfrak{c}(\beta^{-1}\alpha)-1} \leq \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha)} \leq c_4 2^{-\mathfrak{m}(\beta^{-1}\alpha)r} r^{\mathfrak{c}(\beta^{-1}\alpha)-1}. \quad (1.2.2)$$

Доказательство лемм 1.2.2 и 1.2.3 приведено в [8].

1.3. В этом пункте приведём некоторые сведения о рассматриваемых в работе функциональных пространствах и действующих в них операторах, которые используются в следующем параграфе.

Как показано в [3], [4], справедлива

Лемма 1.3.1

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $1 \leq p < \infty$. Тогда

1) при $j = 1, \dots, d$ для любого непрерывного линейного оператора $T : L_p(I) \mapsto L_p(I)$ существует единственный непрерывный линейный оператор $\mathcal{T}^j : L_p(I^d) \mapsto L_p(I^d)$, для которого для любой функции $f \in L_p(I^d)$ почти для всех $(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_d) \in I^{d-1}$ в $L_p(I)$ выполняется равенство

$$(\mathcal{T}^j f)(x_1, \dots, x_{j-1}, \cdot, x_{j+1}, \dots, x_d) = (T(f(x_1, \dots, x_{j-1}, \cdot, x_{j+1}, \dots, x_d)))(\cdot), \quad (1.3.1)$$

2) при этом, для каждого $j = 1, \dots, d$ отображение $V_j^{L_p}$, которое каждому оператору $T \in \mathcal{B}(L_p(I), L_p(I))$ ставит в соответствие оператор $V_j^{L_p}(T) = \mathcal{T}^j \in \mathcal{B}(L_p(I^d), L_p(I^d))$, удовлетворяющий (1.3.1), является непрерывным гомоморфизмом банаховой алгебры $\mathcal{B}(L_p(I), L_p(I))$ в банахову алгебру $\mathcal{B}(L_p(I^d), L_p(I^d))$,

3) причём, для любых операторов $S, T \in \mathcal{B}(L_p(I), L_p(I))$ при любых $i, j = 1, \dots, d : i \neq j$, соблюдается равенство

$$(V_i^{L_p}(S)V_j^{L_p}(T))f = (V_j^{L_p}(T)V_i^{L_p}(S))f, f \in L_p(I^d).$$

В [4] также установлена

Лемма 1.3.2

Пусть $d \in \mathbb{N}$. Тогда

1) при $j = 1, \dots, d$ для любого непрерывного линейного оператора $T : C(\bar{I}) \mapsto C(\bar{I})$ существует единственный непрерывный линейный оператор $\mathcal{T}^j : C(\bar{I}^d) \mapsto C(\bar{I}^d)$, обладающий тем свойством, что для любой функции $f \in C(\bar{I}^d)$ для всех $(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_d) \in \bar{I}^{d-1}$ при любом $x_j \in \bar{I}$ имеет место равенство

$$(\mathcal{T}^j f)(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_d) = (T(f(x_1, \dots, x_{j-1}, \cdot, x_{j+1}, \dots, x_d)))(x_j), \quad (1.3.2)$$

2) при этом, для каждого $j = 1, \dots, d$ отображение V_j^C , которое каждому оператору $T \in \mathcal{B}(C(\bar{I}), C(\bar{I}))$ ставит в соответствие оператор

$V_j^C(T) = \mathcal{T}^j \in \mathcal{B}(C(\bar{I}^d), C(\bar{I}^d))$, удовлетворяющий (1.3.2), является непрерывным гомоморфизмом банаховой алгебры $\mathcal{B}(C(\bar{I}), C(\bar{I}))$ в банахову алгебру $\mathcal{B}(C(\bar{I}^d), C(\bar{I}^d))$,

3) причём, для любых операторов $S, T \in \mathcal{B}(C(\bar{I}), C(\bar{I}))$ при любых $i, j = 1, \dots, d : i \neq j$, справедливо равенство

$$V_i^C(S)V_j^C(T) = V_j^C(T)V_i^C(S). \quad (1.3.3)$$

Замечание.

Если при $d \in \mathbb{N}, 1 \leq p \leq q < \infty$, оператор $T \in \mathcal{B}(L_p(I), L_p(I)) \cap \mathcal{B}(L_q(I), L_q(I))$ ($T \in \mathcal{B}(L_p(I), L_p(I)) \cap \mathcal{B}(C(\bar{I}), C(\bar{I}))$), то при $j = 1, \dots, d$ для $f \in L_q(I^d)$ ($f \in C(\bar{I}^d)$) справедливо равенство $(V_j^{L_p}T)f = (V_j^{L_q}T)f = ((V_j^{L_p}T)f) = (V_j^C T)f$. Поэтому символы L_p, L_q, C в качестве индексов у V_j можно опускать.

Приведём ещё одно вспомогательное утверждение.

Лемма 1.3.3

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}^d, 1 \leq p < \infty$. Тогда существует константа $c_1(d, l) > 0$ такая, что для любых $x^0 \in \mathbb{R}^d, \delta \in \mathbb{R}_+^d$ таких, что $Q = (x^0 + \delta I^d) \subset I^d$, для любой функции $f \in L_p(I^d)$, для любого $\xi \in \mathbb{R}^d$, для любых множеств $J, J' \subset \{1, \dots, d\}$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} & \|\Delta_\xi^{l_{XJ}}((\prod_{j \in J'} V_j(E - P_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j-1}))f)\|_{L_p(Q_\xi^{l_{XJ}})} \\ & \leq c_1 \left(\prod_{j \in J' \setminus J} \delta_j^{-1/p} \right) \left(\int_{(\delta B^d)^{J' \setminus J}} \int_{Q_\xi^{l_{XJ \cup J'}}} |(\Delta_\xi^{l_{XJ \cup J'}} f)(x)|^p dx d\xi^{J' \setminus J} \right)^{1/p}, \end{aligned} \quad (1.3.4)$$

где E – тождественный оператор.

Доказательство леммы 1.3.3 дословно повторяет доказательство аналогичного утверждения в [4]. В [4] также доказаны теорема 1.3.4 и предложение 1.3.5.

Теорема 1.3.4

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ и $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ удовлетворяют условию

$$\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \mathbf{e} > 0. \quad (1.3.5)$$

Тогда существуют константы $c_2(d, \alpha) > 0$ и $c_3(d, \alpha, p, q, \lambda) > 0$ такие, что при любых $\delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$ для $Q = x^0 + \delta I^d$ для $f \in S_p^\alpha H(Q)$ при $l = l(\alpha)$

имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(Q)} &\leq c_3 \delta^{-\lambda-p^{-1}\epsilon+q^{-1}\epsilon} \left(\|f\|_{L_p(Q)} + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} \delta_j^{\lambda_j+(p^{-1}-q^{-1})_+} \right) \right. \\ &\times \int_{(c_2 \delta I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-\lambda_j-p^{-1}-(p^{-1}-q^{-1})_+-1} \right) \left(\int_{(tB^d)^J} \int_{Q_\xi^{l \times J}} |\Delta_\xi^{l \chi_J} f(x)|^p dx d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \Big). \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

Предложение 1.3.5

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty$ таковы, что

$$\alpha - p^{-1}\epsilon > 0. \quad (1.3.7)$$

Тогда для любой функции $f \in S_p^\alpha H(I^d)$ существует функция $F \in C(\bar{I}^d)$ такая, что почти для всех $x \in I^d$ верно равенство $f(x) = F(x)$, т.е. $S_p^\alpha H(I^d) \subset C(\bar{I}^d)$.

§2. Оценка сверху наилучшей точности восстановления в $L_q(I^d)$ производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из $\mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$

2.1. В этом пункте определим объекты, используемые для построения подходящих приближений, и приведем ещё факты, на которые опирается вывод интересующей нас оценки. Введём в рассмотрение систему разбиений единицы на кубе I^d , используемую для построения средств приближения. Для этого обозначим через $\psi^{1,0}$ характеристическую функцию интервала I , т.е. функцию определяемую равенством

$$\psi^{1,0}(x) = \begin{cases} 1, & \text{для } x \in I; \\ 0, & \text{для } x \in \mathbb{R} \setminus I. \end{cases}$$

При $m \in \mathbb{N}$ положим

$$\psi^{1,m}(x) = \int_I \psi^{1,m-1}(x-y) dy,$$

а для $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ определим

$$\psi^{d,m}(x) = \prod_{j=1}^d \psi^{1,m_j}(x_j), x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d.$$

Для $d \in \mathbb{N}, x, y \in \mathbb{R}^d$ будем писать $x \leq y$ ($x < y$), если для каждого $j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство $x_j \leq y_j$ ($x_j < y_j$).

Для $d \in \mathbb{N}, m, n \in \mathbb{Z}^d : m \leq n$, обозначим

$$\mathcal{N}_{m,n}^d = \{\nu \in \mathbb{Z}^d : m \leq \nu \leq n\} = \prod_{j=1}^d \mathcal{N}_{m_j, n_j}^1.$$

Опираясь на определения, используя индукцию, нетрудно проверить следующие свойства функций $\psi^{d,m}, d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$,

1) При $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$

$$\text{sign } \psi^{d,m}(x) = \begin{cases} 1, & \text{для } x \in ((m + \mathbf{e})I^d); \\ 0, & \text{для } x \in \mathbb{R}^d \setminus ((m + \mathbf{e})I^d), \end{cases}$$

2) при $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ для каждого $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ обобщённая производная $\mathcal{D}^\lambda \psi^{d,m} \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$,

3) при $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ почти для всех $x \in \mathbb{R}^d$ справедливо равенство

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d} \psi^{d,m}(x - \nu) = 1,$$

4) при $m \in \mathbb{Z}_+$ почти для всех $x \in \mathbb{R}$ имеет место равенство

$$\psi^{1,m}(x) = \sum_{\mu \in \mathcal{N}_{0,m+1}^1} a_\mu^m \psi^{1,m}(2x - \mu),$$

где $a_\mu^m = 2^{-m} C_\mu^m$,

5) при $m \in \mathbb{Z}_+$ система функций $\{\psi^{1,m}(x - \nu), \nu \in \mathcal{N}_{-m,0}^1\}$ – линейно независима на I .

При $d \in \mathbb{N}$ для $t \in \mathbb{R}^d$ через 2^t будем обозначать вектор $2^t = (2^{t_1}, \dots, 2^{t_d})$.

Для $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ обозначим

$$g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) = \psi^{d,m}(2^\kappa x - \nu) = \prod_{j=1}^d \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j} x_j - \nu_j), x \in \mathbb{R}^d,$$

$$Q_{\kappa,\nu}^d = 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} I^d.$$

Из первого среди приведенных выше свойств функций $\psi^{d,m}$ следует, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ носитель $\text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} = 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \mathbf{e}) \bar{I}^d$.

Отметим некоторые полезные для нас свойства носителей функций $g_{\kappa,\nu}^{d,m}$.

Для $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ справедливо следующее:

$$\{\nu \in \mathbb{Z}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap I^d \neq \emptyset\} = \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \mathbf{e}}^d, \quad (2.1.1)$$

2) для каждого $\nu' \in \mathbb{Z}^d$ имеет место равенство

$$\{\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu'}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset\} = \nu' + \mathcal{N}_{-m, 0}^d. \quad (2.1.2)$$

Из (2.1.2) вытекает, что

$$\text{card}\{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \cap Q_{\kappa, \nu'}^d \neq \emptyset\} \leq c_1(d, m), \quad (2.1.3)$$

$$d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+, \nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d.$$

Из свойства 3) функций $\psi^{d, m}$ и равенства (2.1.1) вытекает, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+$ почти для всех $x \in I^d$ соблюдается равенство

$$\sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d} g_{\kappa, \nu}^{d, m}(x) = 1.$$

Имея в виду свойство 2) функций $\psi^{d, m}$, отметим, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+, \nu \in \mathbb{Z}^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ выполняется равенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_\infty(\mathbb{R}^d)} = c_2(d, m, \lambda) 2^{(\kappa, \lambda)}. \quad (2.1.4)$$

При доказательстве леммы 2.2.1 понадобится

Лемма 2.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d, D$ — область в $\mathbb{R}^d$ и f — бесконечно дифференцируемая в области D функция, а $g \in L_1(D)$, причём, для каждого $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ обобщённая производная $\mathcal{D}^\mu g \in L_1(D)$. Тогда в пространстве обобщённых функций в области D имеет место равенство

$$\mathcal{D}^\lambda(fg) = \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \mathcal{D}^{\lambda - \mu} f \mathcal{D}^\mu g. \quad (2.1.5)$$

Теперь напомним некоторые сведения, касающиеся интерполяционных полиномов.

При $l \in \mathbb{Z}_+$ в интервале I фиксируем систему из $(l + 1)$ различных точек $\{\xi_{1,0}^{1, l, \lambda} \in I, \lambda = 0, \dots, l\}$ и построим систему полиномов $\{\pi_{1,0}^{1, l, \lambda} \in \mathcal{P}^{1, l}, \lambda = 0, \dots, l\}$, обладающую тем свойством, что при $\lambda, \mu = 0, \dots, l$ выполняются равенства

$$\pi_{1,0}^{1, l, \lambda}(\xi_{1,0}^{1, l, \mu}) = \begin{cases} 1, & \text{при } \lambda = \mu; \\ 0, & \text{при } \lambda \neq \mu. \end{cases}$$

При $l \in \mathbb{Z}_+, \delta \in \mathbb{R}_+, x^0 \in \mathbb{R}$ определим систему точек $\{\xi_{\delta, x^0}^{1, l, \lambda} \in x^0 + \delta I, \lambda = 0, \dots, l\}$ и систему полиномов $\{\pi_{\delta, x^0}^{1, l, \lambda} \in \mathcal{P}^{1, l}, \lambda = 0, \dots, l\}$, полагая

$$\xi_{\delta, x^0}^{1, l, \lambda} = x^0 + \delta \xi_{1,0}^{1, l, \lambda}, \pi_{\delta, x^0}^{1, l, \lambda}(x) = \pi_{1,0}^{1, l, \lambda}(\delta^{-1}(x - x^0)).$$

Ясно, что при $\lambda, \mu = 0, \dots, l$ выполняются равенства

$$\pi_{\delta, x^0}^{1, l, \lambda}(\xi_{\delta, x^0}^{1, l, \mu}) = \pi_{1, 0}^{1, l, \lambda}(\xi_{1, 0}^{1, l, \mu}) = \begin{cases} 1, & \text{при } \lambda = \mu; \\ 0, & \text{при } \lambda \neq \mu. \end{cases} \quad (2.1.6)$$

При $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$ построим систему точек $\{\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} \in x^0 + \delta I^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$ и систему полиномов $\{\pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} \in \mathcal{P}^{d, l}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$, задавая

$$(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda})_j = \xi_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j, \lambda_j}, j = 1, \dots, d, \pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}(x) = \prod_{j=1}^d \pi_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j, \lambda_j}(x_j).$$

Из (2.1.6) следует, что при $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l)$ справедливы равенства

$$\pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \mu}) = \prod_{j=1}^d \pi_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j, \lambda_j}(\xi_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j, \mu_j}) = \begin{cases} 1, & \text{при } \lambda = \mu; \\ 0, & \text{при } \lambda \neq \mu. \end{cases} \quad (2.1.7)$$

Понятно, что

$$\pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}(x) = \prod_{j=1}^d \pi_{1, 0}^{1, l_j, \lambda_j}(\delta_j^{-1}(x_j - x_j^0)) = \pi_{\epsilon, 0}^{d, l, \lambda}(\delta^{-1}(x - x^0)),$$

$$\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} = x^0 + \delta \xi_{\epsilon, 0}^{d, l, \lambda}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l).$$

При $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$ обозначим через $A_{\delta, x^0}^{d, l} : \mathbb{R}^{(l+\epsilon)^c} \mapsto \mathcal{P}^{d, l}$ линейный оператор, который каждому набору чисел $t = \{t_\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$ ставит в соответствие полином

$$A_{\delta, x^0}^{d, l} t = \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)} t_\lambda \pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} \in \mathcal{P}^{d, l},$$

а через $\phi_{\delta, x^0}^{d, l}$ обозначим непрерывное линейное отображение пространства $C(x^0 + \delta \bar{I}^d)$ в $\mathbb{R}^{(l+\epsilon)^c}$, которое каждой функции $f \in C(x^0 + \delta \bar{I}^d)$ сопоставляет набор её значений $\{f(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}), \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$, и определим линейный непрерывный оператор $\mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} : C(x^0 + \delta \bar{I}^d) \mapsto \mathcal{P}^{d, l} \cap C(x^0 + \delta \bar{I}^d)$ равенством

$$\mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} = A_{\delta, x^0}^{d, l} \circ \phi_{\delta, x^0}^{d, l}.$$

Как видно из (2.1.7), при $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$ имеет место равенство

$$(\mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} f)(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}) = f(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}).$$

Заметим, что вследствие (2.1.7) система полиномов $\{\pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} \in \mathcal{P}^{d, l}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$ – линейно независима, и число элементов этой системы $\text{card } \mathbb{Z}_+^d(l) = \dim \mathcal{P}^{d, l}$, и, следовательно, эта система является базисом в $\mathcal{P}^{d, l}$. Поэтому для любого полинома $f \in \mathcal{P}^{d, l}$ существует набор чисел $\{t_\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$ такой, что

$$f = \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)} t_\lambda \pi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}.$$

Отсюда в виду (2.1.7) получаем

$$t_\lambda = f(\xi_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}), \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l),$$

т.е.

$$f = \mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} f, f \in \mathcal{P}^{d, l}. \quad (2.1.8)$$

Несложно проверить (см. [4]), что при $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$ для $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ таких, что $x^0 + \delta I^d \subset I^d$, для $f \in C(\bar{I}^d)$ и $x \in \bar{I}^d$ выполняется равенство

$$((\prod_{j=1}^d V_j(\mathcal{P}_{\delta_j, x_j^0}^{1, l_j}))f)(x) = (\mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} f)(x). \quad (2.1.9)$$

В [4] установлена

Лемма 2.1.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$ и $\rho, \sigma \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда существует константа $c_3(d, l, \rho, \sigma) > 0$ такая, что для любых $x^0, y^0 \in \mathbb{R}^d$ и $\delta \in \mathbb{R}_+^d$, для которых $(x^0 + \sigma \delta I^d) \subset (y^0 + \rho \delta I^d) \subset I^d$, для любого множества $J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1$ для $f \in C(\bar{I}^d)$ соблюдается неравенство

$$\|(\prod_{j \in J} V_j(E - \mathcal{P}_{\sigma_j \delta_j, x_j^0}^{1, l_j}))f\|_{L_\infty(D)} \leq c_3 \|f\|_{L_\infty(D)}, \quad (2.1.10)$$

где $D = y^0 + \rho \delta I^d$. Определим операторы, с которыми мы будем иметь дело в следующем пункте, и отметим их свойства, полезные для нас.

Для $d \in \mathbb{N}, l, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d$ определим непрерывный линейный оператор $\mathbf{R}_{\kappa, \nu}^{d, l} : C(\bar{I}^d) \mapsto \mathcal{P}^{d, l} \cap C(\bar{I}^d)$ равенством

$$\mathbf{R}_{\kappa, \nu}^{d, l} f = \mathcal{P}_{\delta, x^0}^{d, l} (f|_{(x^0 + \delta \bar{I}^d)}), f \in C(\bar{I}^d),$$

при $\delta = 2^{-\kappa}, x^0 = 2^{-\kappa} \nu$.

Как видно из (2.1.9), для $d \in \mathbb{N}, l, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d$ верно равенство

$$\mathbf{R}_{\kappa, \nu}^{d, l} = \prod_{j=1}^d V_j(\mathbf{R}_{\kappa_j, \nu_j}^{1, l_j}).$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ положим

$$x_+ = ((x_1)_+, \dots, (x_d)_+),$$

где $t_+ = \frac{1}{2}(t + |t|)$, $t \in \mathbb{R}$.

При $d \in \mathbb{N}, l, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ определим линейный оператор $R_\kappa^{d,l,m} : C(\bar{I}^d) \mapsto L_\infty(\mathbb{R}^d)$ равенством

$$R_\kappa^{d,l,m} f = \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2\kappa - \epsilon}^d} (R_{\kappa, \nu_+}^{d,l} f) g_{\kappa, \nu}^{d,m}.$$

Как показано в [4], справедлива

Лемма 2.1.3

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty$ удовлетворяют (1.3.7) и $l = l(\alpha), m \in \mathbb{Z}_+^d$. Тогда для любой функции $f \in \mathcal{S}_p^\alpha \mathcal{H}(I^d)$ справедливо соотношение

$$\lim_{m(\kappa) \rightarrow \infty} \|f - R_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_p(I^d)} = 0. \quad (2.1.11)$$

При $d \in \mathbb{N}, l, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ определим линейный оператор $\mathcal{R}_\kappa^{d,l,m} : C(\bar{I}^d) \mapsto L_\infty(\mathbb{R}^d)$, полагая

$$\mathcal{R}_\kappa^{d,l,m} = \sum_{v \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} (-\epsilon)^v R_{\kappa-v}^{d,l,m}.$$

В [4] получено представление

$$\mathcal{R}_\kappa^{d,l,m} = \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2\kappa - \epsilon}^d} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d,l,m}, \quad (2.1.12)$$

где $\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d,l,m} : C(\bar{I}^d) \mapsto \mathcal{P}^{d,l}$ – линейный оператор, значение которого для $f \in C(\bar{I}^d)$ определяется равенством

$$\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d,l,m} f = \sum_{v \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} (-\epsilon)^v \sum_{\rho \in \mathcal{P}_{\kappa, \nu, v}^{d,m}} \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(v)} a_{\nu_j - 2\rho_j}^{m_j} \right) (R_{\kappa-v, \rho_+}^{d,l} f),$$

представляется в виде

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d,l,m} = & \sum_{\gamma \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(\kappa) \subset \mathbf{s}(\gamma)} (-\epsilon)^\gamma \sum_{v \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} (-\epsilon)^v \sum_{\rho \in \mathcal{P}_{\kappa, \nu, v}^{d,m}} \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(v)} a_{\nu_j - 2\rho_j}^{m_j} \right) \\ & \times \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\gamma)} V_j(E - R_{\kappa_j - v_j, \rho_+ + j}^{1, l_j}) \right), \end{aligned} \quad (2.1.13)$$

а множество

$$\begin{aligned} P_{\kappa, \nu, v}^{d, m} = \{ \rho \in \mathcal{N}_{-m, 2^{\kappa-v-\epsilon}}^d : \rho_j = \nu_j, j \in \mathcal{N}_{1, d}^1 \setminus \mathbf{s}(v), \\ (\nu_j - 2\rho_j) \in \mathcal{N}_{0, m_j+1}^1, j \in \mathbf{s}(v) \}, d \in \mathbb{N}, l, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \\ \nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^{\kappa-\epsilon}}^d, v \in \Upsilon^d : \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa). \end{aligned}$$

2.2. В этом пункте будет установлена оценка сверху наилучшей точности восстановления в $L_q(I^d)$ производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из классов $\mathcal{S}_{p, \theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$.

Сначала опишем постановку задачи.

Пусть T – топологическое пространство, X – банахово пространство над $\mathbb{R}$, $U : D(U) \mapsto X$ – линейный оператор с областью определения $D(U) \subset C(T)$, принимающий значения в X . Пусть ещё $K \subset D(U)$ – некоторый класс функций.

Для $n \in \mathbb{N}$ через $\Phi_n(C(T))$ обозначим совокупность всех отображений $\phi : C(T) \mapsto \mathbb{R}^n$, для каждого из которых существует набор точек $\{t^j \in T, j = 1, \dots, n\}$ такой, что

$$\phi(f) = (f(t^1), \dots, f(t^n)), f \in C(T).$$

При $n \in \mathbb{N}$ обозначим также через $\mathcal{A}^n(X)(\overline{\mathcal{A}}^n(X))$ множество всех отображений (всех линейных отображений) $A : \mathbb{R}^n \mapsto X$.

Тогда при $n \in \mathbb{N}$ положим

$$\sigma_n(U, K, X) = \inf_{A \in \mathcal{A}^n(X), \phi \in \Phi_n(C(T))} \sup_{f \in K} \|Uf - A \circ \phi(f)\|_X,$$

а

$$\overline{\sigma}_n(U, K, X) = \inf_{A \in \overline{\mathcal{A}}^n(X), \phi \in \Phi_n(C(T))} \sup_{f \in K} \|Uf - A \circ \phi(f)\|_X.$$

Лемму 2.2.1 можно рассматривать как модификацию леммы 3.4 из [4].

Лемма 2.2.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty, m \in \mathbb{Z}_+^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ и выполняется (1.3.7). Тогда существуют константы $c_1(d, \alpha, p, q, m, \lambda) > 0, c_2(d, m) > 0, c_3(d, \alpha) > 0$ и $\epsilon \in \mathbb{R}_+^d$ такие, что для любой функции

$f \in S_p^\alpha H(I^d)$ при $l = l(\alpha)$ и $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d \setminus \{0\}$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_q(I^d)} &\leq c_1 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1}-q^{-1})+\epsilon)} \left(\Omega^{l\chi_{\mathfrak{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathfrak{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\ &+ \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (\Omega^{l\chi_{J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}(f, (u\chi_{J \setminus \mathfrak{s}(\kappa)} \right. \\ &\left. \left. + 2^{-\kappa} u\chi_{\mathfrak{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathfrak{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p}. \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

Доказательство.

Сначала построим некоторые вспомогательные объекты, которые нам понадобятся при доказательстве.

При $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d$ зададим точку $\mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,m}$ и вектор $\delta_{\kappa,\nu}^{d,m}$, полагая

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,m})_j &= 2^{-\kappa_j} \min((\nu_j - 2m_j - 1)_+, (2^{\kappa_j} - 2m_j - 3)_+), (\delta_{\kappa,\nu}^{d,m})_j \\ &= 2^{-\kappa_j} \min(2^{\kappa_j}, 2m_j + 3), j = 1, \dots, d, \end{aligned}$$

и определим клетку $\mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m}$ равенством $\mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m} = \mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,m} + \delta_{\kappa,\nu}^{d,m} I^d$, а через $\chi_{\mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m}}$ обозначим характеристическую функцию множества $\mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m}$.

Из определения следует, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d$ множество

$$\mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m} \subset I^d, \quad (2.2.2)$$

а также

$$Q_{\kappa,\nu}^d \subset \mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m}. \quad (2.2.3)$$

С помощью (2.2.3) легко проверить, что при $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ существует константа $c_4(d, m) > 0$ такая, что для $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ и $x \in I^d$ верно неравенство

$$\text{card}\{\nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d : x \in \mathbb{D}_{\kappa,\nu}^{d,m}\} \leq c_4(d, m). \quad (2.2.4)$$

Пользуясь тем, что для $t \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}_+$ справедливы соотношения $(at)_+ = at_+$ и $t_+ \leq (t+a)_+ \leq t_+ + a$, а также используя (2.1.2), несложно показать, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, для $\nu' \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m,2^\kappa-\epsilon}^d : Q_{\kappa,\nu'}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset, v \in \Upsilon^d : \mathfrak{s}(v) \subset \mathfrak{s}(\kappa), \rho \in \mathbb{P}_{\kappa,\nu,v}^{d,m}$ имеет место включение

$$Q_{\kappa-v,\rho_+}^d \subset \mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m}. \quad (2.2.5)$$

Отметим ещё, что

$$\text{card } \mathbb{P}_{\kappa,\nu,v}^{d,m} \leq c_5(d, m), \quad (2.2.6)$$

$d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d, v \in \Upsilon^d : \mathfrak{s}(v) \subset \mathfrak{s}(\kappa)$.

Определим ещё при $l, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+, \nu \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - 1}^d$ непрерывный линейный оператор $\mathbf{S}_{\kappa, \nu}^{l, m} : L_1(I) \mapsto \mathcal{P}^{1, l}(I) \cap L_\infty(I)$, полагая для $f \in L_1(I)$ значение

$$\mathbf{S}_{\kappa, \nu}^{l, m} f = \mathbf{P}_{\delta, x^0}^{1, l}(f|_{(x^0 + \delta I)})$$

при $\delta = 2^{-\kappa} \min(2^\kappa, 2m + 3), x^0 = 2^{-\kappa} \min((\nu - 2m - 1)_+, (2^\kappa - 2m - 3)_+)$.

Теперь в условиях леммы 2.2.1 в силу (2.1.5) и (2.1.12) так же, как (1.55) в [4], получаем

$$\|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_q(I^d)} \leq \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \left\| \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d} \mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(I^d)}. \quad (2.2.7)$$

Оценивая правую часть (2.2.7), подобно (1.56) в [4], при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ ВЫВОДИМ

$$\begin{aligned} & \left\| \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d} \mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(I^d)}^q \leq \\ & \sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d} \left(\sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \cap Q_{\kappa, \nu'}^d \neq \emptyset} \|\mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_q(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \right)^q. \end{aligned} \quad (2.2.8)$$

Применяя (2.1.4), (1.1.1) и (2.2.3), находим, что при $\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \cap Q_{\kappa, \nu'}^d \neq \emptyset$, справедливо неравенство

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_q(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \\ & \leq \|\mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_\infty(\mathbb{R}^d)} \|\mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f)\|_{L_q(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \\ & \leq c_6 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} \|\mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f)\|_{L_q(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \\ & \leq c_6 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} c_7 (2^{-\kappa})^{-\mu+q^{-1}\epsilon} \|\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_\infty(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \\ & = c_8 2^{(\kappa, \lambda-q^{-1}\epsilon)} \|\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_\infty(Q_{\kappa, \nu'}^d)} \leq c_8 2^{(\kappa, \lambda-q^{-1}\epsilon)} \|\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_\infty(\mathfrak{p}_{\kappa, \nu'}^{d, m})}. \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

Из (2.1.13) для $\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^\kappa - \epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \cap Q_{\kappa, \nu'}^d \neq \emptyset$, имеем

неравенство

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{U}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& \leq \sum_{\gamma \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(\kappa) \subset \mathbf{s}(\gamma)} \sum_{v \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} \sum_{\rho \in \mathbb{P}_{\kappa,\nu,v}^{d,m}} \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(v)} a_{\nu_j-2\rho_j}^{m_j} \right) \\
& \quad \times \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\gamma)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})}. \quad (2.2.10)
\end{aligned}$$

Далее, для $\nu' \in \mathcal{N}_{0,2\kappa-\epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m,2\kappa-\epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,\nu'}^d \neq \emptyset, \gamma \in \Upsilon^d : \mathbf{s}(\kappa) \subset \mathbf{s}(\gamma), v \in \Upsilon^d : \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa), \rho \in \mathbb{P}_{\kappa,\nu,v}^{d,m}$, используя (1.3.3), а затем с учётом (2.2.5), (2.2.2) применяя (2.1.10), получаем

$$\begin{aligned}
& \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\gamma)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& = \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\gamma) \setminus \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& \leq c_9 \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})}, \quad (2.2.11)
\end{aligned}$$

и пользуясь тем, что в виду (2.1.8) при $j = 1, \dots, d$ соблюдено равенство

$$E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1} = (E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1})(E - \mathbf{S}_{\kappa_j, \nu'_j}^{l_j-1, m_j}),$$

благодаря п. 2 леммы 1.3.2 и (1.3.3), а также в силу (2.2.5), (2.2.2), (2.1.10) выводим

$$\begin{aligned}
& \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& = \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j((E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1})(E - \mathbf{S}_{\kappa_j, \nu'_j}^{l_j-1, m_j})) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& = \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} (V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) V_j(E - \mathbf{S}_{\kappa_j, \nu'_j}^{l_j-1, m_j})) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\
& = \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{R}_{\kappa_j-v_j, \rho_{+j}}^{1,l_j-1}) \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{S}_{\kappa_j, \nu'_j}^{l_j-1, m_j}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \leq \\
& \quad c_{10} \left\| \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{S}_{\kappa_j, \nu'_j}^{l_j-1, m_j}) \right) f \right\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})}. \quad (2.2.12)
\end{aligned}$$

Соединяя (2.2.10), (2.2.11), (2.2.12), и учитывая (2.2.6), находим, что для $\nu' \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m,2^\kappa-\epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,\nu'}^d \neq \emptyset$, выполняется неравенство

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{U}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\ & \leq \sum_{\gamma \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(\gamma) \subset \mathbf{s}(\nu)} \sum_{v \in \Upsilon^d: \mathbf{s}(v) \subset \mathbf{s}(\kappa)} \sum_{\rho \in \mathbb{P}_{\kappa,\nu,v}^{d,m}} c_{11} \|(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{s}_{\kappa_j,\nu'_j}^{l_j-1,m_j})) f\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \\ & \leq c_{12} \|(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{s}_{\kappa_j,\nu'_j}^{l_j-1,m_j})) f\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})}. \end{aligned} \quad (2.2.13)$$

Применяя сначала к правой части (2.2.13) неравенство (1.3.6) при $\lambda = 0, q = \infty$, а затем используя (1.3.4), приходим к неравенству

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{U}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_\infty(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \leq c_{13} (\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m})^{-p^{-1}\epsilon} \left(\|(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{s}_{\kappa_j,\nu'_j}^{l_j-1,m_j})) f\|_{L_p(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})} \right. \\ & \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} (\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m})_j^{p^{-1}} \right) \int_{(c_{14} \delta_{\kappa,\nu'}^{d,m} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-2p^{-1}-1} \right) \\ & \quad \times \left(\int_{(tB^d)^J} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi_J}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_J}} ((\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} V_j(E - \mathbf{s}_{\kappa_j,\nu'_j}^{l_j-1,m_j})) f)(x)|^p dx d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \Big) \\ & \leq c_{15} 2^{(\kappa,\epsilon)p^{-1}} \left(c_{16} \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} (\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m})_j^{-1/p} \right) \left(\int_{(\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{1/p} \right. \\ & \quad + c_{17} \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j p^{-1}} \right) \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-2p^{-1}-1} \right) \left(\int_{(tB^d)^J} \left(c_{18} \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} (\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m})_j^{-1/p} \right) \right. \right. \\ & \quad \times \left. \left. \left(\int_{(\delta_{\kappa,\nu'}^{d,m} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} \right)^{1/p} d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \Big) \\ & \leq c_{19} 2^{(\kappa,\epsilon)p^{-1}} \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{1/p} \right. \\ & \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j p^{-1}} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j/p} \right) \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-2p^{-1}-1} \right) \\ & \quad \times \left(\int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \Big), \end{aligned} \quad (2.2.14)$$

$\nu' \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m,2^\kappa-\epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,\nu'}^d \neq \emptyset$.

Фиксируя $\epsilon \in \mathbb{R}_+^d$ так, чтобы соблюдалось условие $\alpha - p^{-1}\epsilon - \epsilon > 0$, и применяя неравенство Гёльдера, для $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, \nu' \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d$ имеем

$$\begin{aligned}
& \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-2p^{-1}-1} \right) \\
& \times \left(\int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \\
& = \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{\alpha_j - p^{-1} - \epsilon_j - 1/p'} \right) \left(\prod_{j \in J} t_j^{-(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1/p} \right) \\
& \times \left(\int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J \right)^{1/p} dt^J \\
& \leq \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{p'(\alpha_j - p^{-1} - \epsilon_j) - 1} \right) dt^J \right)^{1/p'} \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{1/p} \\
& = c_{20} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - p^{-1} - \epsilon_j)} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{1/p}.
\end{aligned} \tag{2.2.15}$$

Соединяя (2.2.9), (2.2.14), (2.2.15), заключаем, что при $\nu' \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \nu \in \mathcal{N}_{-m,2^\kappa-\epsilon}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,\nu'}^d \neq \emptyset$, справедливо неравенство

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,\nu'}^d)} \leq c_{21} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \\
& \times \left(\left(\prod_{j \in \mathfrak{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,\mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,\mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa)} \right)^{1/p} \right. \\
& + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa,\nu'}^{d,m})_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi,J \cup \mathfrak{s}(\kappa)}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathfrak{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{1/p} \Bigg).
\end{aligned} \tag{2.2.16}$$

Подставляя (2.2.16) в (2.2.8) и учитывая (2.1.3), а затем применяя неравенства Гёльдера с показателями q и $p/q \leq 1$, и используя (2.2.4), получаем, что при $p \leq q$ и $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(I^d)}^q \leq \sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \left(c_{22} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \right. \\
& \quad \times \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{1/p} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{1/p} \right) \Big)^q \\
& \leq \sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} (c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \right) \\
& = (c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \right. \\
& \quad \times \sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \\
& \quad \times \sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq (c_{23}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \right. \\
&\quad \times \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \\
&\quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \\
&\quad \times \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
&\quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m})_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \Bigg) \\
&\leq (c_{23}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \right. \\
&\quad \times \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} \chi_{\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m}}(x) |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \\
&\quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
&\quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} \chi_{\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m}}(x) |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \Bigg) \\
&= (c_{23}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \right. \\
&\quad \times \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \chi_{\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m}}(x) \right) |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \\
&\quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
&\quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} \left(\sum_{\nu' \in \mathcal{N}_{0, 2^{\kappa-\epsilon}}^d} \chi_{\mathbb{D}_{\kappa, \nu'}^{d, m}}(x) \right) |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \Bigg) \\
&\leq (c_{23}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} c_4 |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \right. \\
&\quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
&\quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(I^d)_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} c_4 |\Delta_{\xi}^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \Bigg),
\end{aligned}$$

ИЛИ

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in \mathcal{N}_{-m, 2^\kappa - \epsilon}^d} \mathcal{D}^\mu(\mathcal{U}_{\kappa, \nu}^{d, l-\epsilon, m} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(I^d)} \\
& \leq c_{24} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(I^d)_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{q/p} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j q(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j q/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(I^d)_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{q/p} \Big)^{1/q} \\
& \leq c_{24} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \int_{(I^d)_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \right)^{1/p} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \int_{(tB^d)^J} \int_{(c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \int_{(I^d)_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}} |\Delta_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f(x)|^p dx d\xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} d\xi^J dt^J \right)^{1/p} \Big) \\
& \leq c_{24} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa)} (2c_2 2^{-\kappa_j}) \right) \right. \\
& \quad \times \sup_{\xi \in \mathbb{R}^d: \xi^{\mathbf{s}(\kappa)} \in (c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa)}} \text{vrai} \left\| \Delta_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}} f \right\|_{L_p((I^d)_\xi^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}})}^p \Big)^{1/p} \\
& + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} 2^{\kappa_j/p} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j + p^{-1}) - 1} \right) \left(\prod_{j \in J} (2t_j) \right) \right. \\
& \quad \times \left(\prod_{j \in \mathbf{s}(\kappa) \setminus J} (2c_2 2^{-\kappa_j}) \right) \sup_{\xi \in \mathbb{R}^d: \xi^J \in (tB^d)^J, \xi^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J} \in (c_2 2^{-\kappa} B^d)^{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J}} \text{vrai} \left\| \Delta_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}} f \right\|_{L_p((I^d)_\xi^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}})}^p \Big)^{1/p} \Big) \\
& \leq c_{25} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\Omega^{l_{\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1, d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\int_{(c_3 2^{-\kappa} I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} t_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\Omega^{l_{\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}}(f, (t\chi_J + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p dt^J \right)^{1/p} \Big)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= c_{25} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
&+ \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j(\alpha_j - \epsilon_j)} \right) \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} (2^{-\kappa_j} u_j)^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
&\times \left. \left(\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (2^{-\kappa} u \chi_J + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p \left(\prod_{j \in J} 2^{-\kappa_j} du^j \right)^{1/p} \right) \\
&= c_{25} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
&+ \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \left(\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (u \chi_{J \setminus \mathbf{s}(\kappa)} \right. \right. \\
&\left. \left. + 2^{-\kappa} u \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \Big). \quad (2.2.17)
\end{aligned}$$

Подставляя (2.2.17) в (2.2.7), находим, что при $p \leq q$ и $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d \setminus \{0\}$ для $f \in S_p^\alpha H(I^d)$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_q(I^d)} &\leq c_{26} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1} \epsilon - q^{-1} \epsilon)} \left(\Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
&+ \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \left(\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (u \chi_{J \setminus \mathbf{s}(\kappa)} \right. \right. \\
&\left. \left. + 2^{-\kappa} u \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \Big),
\end{aligned}$$

которое совпадает с (2.2.1) при $p \leq q$. Неравенство (2.2.1) при $q < p$ вытекает из неравенства (2.2.1) при $q = p$ и того факта, что для $h \in L_p(I^d)$ при $q < p$ справедлива оценка $\|h\|_{L_q(I^d)} \leq \|h\|_{L_p(I^d)}$. $\square$

Предложение 2.2.2

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $l = l(\alpha)$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, $m \in \mathbb{Z}_+^d$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ и выполняются условия (1.3.5), (1.3.7). Тогда для $f \in \mathcal{S}_p^\alpha \mathcal{H}(I^d)$ в $L_q(I^d)$ имеет место равенство

$$\mathcal{D}^\lambda f = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f. \quad (2.2.18)$$

Предложение 2.2.2 имеется в [4], однако там сходимость ряда, стоящего в правой части (2.2.18), понимается несколько в ином смысле, чем в настоящей работе. Поэтому ниже приводится доказательство предложения 2.2.2.

Доказательство.

В условиях предложения из (2.1.11) на основании леммы 1.2.1 заключаем, что для $f \in \mathcal{S}_p^\alpha \mathcal{H}(I^d)$ в $L_p(I^d)$ справедливо равенство

$$f = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f. \quad (2.2.19)$$

Из (2.2.1) и (1.3.5) (см. также (3.19) в [4]) следует, что для $f \in \mathcal{S}_p^\alpha \mathcal{H}(I^d)$ ряд

$$\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f\|_{L_q(I^d)}$$

сходится, и, значит, ряд

$$\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f$$

сходится в $L_q(I^d)$.

Принимая во внимание это обстоятельство и равенство (2.2.19), для любой бесконечно дифференцируемой финитной функции ϕ , носитель которой $\text{supp } \phi \subset I^d$, имеем

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{D}^\lambda f, \phi \rangle &= (-1)^{(\lambda,\epsilon)} \langle f, \mathcal{D}^\lambda \phi \rangle = (-1)^{(\lambda,\epsilon)} \int_{I^d} f \mathcal{D}^\lambda \phi dx \\ &= \int_{I^d} \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f \right) (-1)^{(\lambda,\epsilon)} \mathcal{D}^\lambda \phi dx = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} (-1)^{(\lambda,\epsilon)} \int_{I^d} (\mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f) \mathcal{D}^\lambda \phi dx \\ &= \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \int_{I^d} \mathcal{D}^\lambda (\mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f) \phi dx = \int_{I^d} \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d} \mathcal{D}^\lambda (\mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f) \right) \phi dx. \end{aligned}$$

А это означает, что в $L_q(I^d)$ имеет место равенство (2.2.18). $\square$

Теорема 2.2.3

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ удовлетворяют условиям (1.3.5), (1.3.7). Пусть ещё $U = \mathcal{D}^\lambda$, $D(U) = \{f \in C(I^d) : \mathcal{D}^\lambda f \in L_q(I^d)\}$, $X = L_q(I^d)$, $K = \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$, $1 \leq \theta \leq \infty$. Тогда существует константа $c_{27}(d, \alpha, p, q, \theta, \lambda) > 0$ и $n_0 \in \mathbb{N}$ такие, что при $n \geq n_0$ выполняется неравенство

$$\bar{\sigma}_n(U, K, X) \leq c_{27} n^{-\mathfrak{m}} (\log n)^{(\mathfrak{m}+1-1/\max(p,\theta))(\mathfrak{c}-1)}, \quad (2.2.20)$$

где

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon), \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon).$$

Доказательство.

Полагая $\mathcal{J} = \{j \in \mathcal{N}_{1,d}^1 : \alpha_j - \lambda_j - (p^{-1} - q^{-1})_+ = \mathfrak{m}\}$, фиксируем вектор $\beta \in \mathbb{R}_+^d$, обладающий следующими свойствами: $\beta_j = 1, j \in \mathcal{J}, \beta_j > 1$ и $\beta_j^{-1}(\alpha_j - \lambda_j - (p^{-1} - q^{-1})_+) > \mathfrak{m}, j \in \mathcal{N}_{1,d}^1 \setminus \mathcal{J}$.

Далее, при $l = l(\alpha)$ определим семейство точек

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,\rho} &= \xi_{\delta,x^0}^{d,l-\epsilon,\rho} = x^0 + \delta \xi_{\epsilon,0}^{d,l-\epsilon,\rho} \text{ (см. п. 2.1), при } x^0 = 2^{-\kappa} \nu, \delta \\ &= 2^{-\kappa}, \rho \in \mathbb{Z}_+^d(l - \epsilon), \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \end{aligned}$$

и для $r \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество точек

$$\{\mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,\rho} : \rho \in \mathbb{Z}_+^d(l - \epsilon), \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, (\kappa, \beta) \leq r\}.$$

Число этих точек, учитывая (1.2.1), удовлетворяет неравенству

$$\begin{aligned} &\text{card}\{\mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,\rho} : \rho \in \mathbb{Z}_+^d(l - \epsilon), \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, (\kappa, \beta) \leq r\} \\ &\leq \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) \leq r} l^\epsilon 2^{(\kappa, \epsilon)} \leq l^\epsilon c_{28} 2^{\mathfrak{M}(\beta^{-1} \epsilon) r} r^{\mathfrak{E}(\beta^{-1} \epsilon) - 1} = l^\epsilon c_{28} 2^r r^{\epsilon - 1} = c_{29} 2^r r^{\epsilon - 1}. \end{aligned}$$

Для $n \geq n_0 = 2c_{29}$ выберем $r \in \mathbb{N}$ так, чтобы соблюдалось соотношение

$$c_{29} 2^r r^{\epsilon - 1} \leq n < c_{29} 2^{r+1} (r+1)^{\epsilon - 1}, \quad (2.2.21)$$

и построим соответствующую этому $r \in \mathbb{N}$ систему точек

$$\{\mathbf{x}_{\kappa,\nu}^{d,l-\epsilon,\rho} : \rho \in \mathbb{Z}_+^d(l - \epsilon), \nu \in \mathcal{N}_{0,2^\kappa-\epsilon}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, (\kappa, \beta) \leq r\}.$$

Тогда в условиях теоремы, взяв некоторое $m \in \mathbb{Z}_+^d$ так, чтобы $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$, нетрудно видеть, что существуют отображения $\phi \in \Phi_n(C(I^d))$ и $A \in \overline{\mathcal{A}}^n(L_q(I^d))$ такие, что для $f \in \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$ имеет место представление

$$A \circ \phi(f) = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) \leq r} \mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d,l-\epsilon,m} f.$$

При этом, в силу (2.2.18), (2.2.1) для $f \in \mathcal{S}_{p,\theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$ выполняется неравен-

CTBO

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\lambda f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(I^d)} = \|\mathcal{D}^\lambda f - \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) \leq r} \mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_q(I^d)} \\
& = \left\| \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} \mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f \right\|_{L_q(I^d)} \leq \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{R}_\kappa^{d, l-\epsilon, m} f\|_{L_q(I^d)} \\
& \leq \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} c_1 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \left(\Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (u\chi_{J \setminus \mathbf{s}(\kappa)} \right. \\
& \quad \left. \left. + 2^{-\kappa} u\chi_{\mathbf{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \Bigg) \\
& = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} c_1 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \\
& \quad + \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} c_1 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (u\chi_{J \setminus \mathbf{s}(\kappa)} + 2^{-\kappa} u\chi_{\mathbf{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \\
& = c_1 \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\Omega^{l\chi_{J \cup \mathbf{s}(\kappa)}}(f, (u\chi_{J \setminus \mathbf{s}(\kappa)} + 2^{-\kappa} u\chi_{\mathbf{s}(\kappa) \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{\mathbf{s}(\kappa) \setminus J})^{J \cup \mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \Bigg) \\
& = c_1 \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \right. \\
& \quad + \sum_{J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J \neq \emptyset} \sum_{J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1: J' \neq \emptyset} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d: (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \\
& \quad \times \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (u\chi_{J \setminus J'} \right. \\
& \quad \left. \left. + 2^{-\kappa} u\chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \Bigg). \quad (2.2.22)
\end{aligned}$$

Оценивая первую сумму в правой части (2.2.22), с помощью неравенства Гёльдера для $f \in K, r \in \mathbb{N}$ получаем

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \\
&= \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)} 2^{(\kappa, \alpha)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \\
&\leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \\
&\times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} (2^{(\kappa, \alpha)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)})^\theta \right)^{1/\theta}, \theta' = \theta/(\theta - 1).
\end{aligned} \tag{2.2.23}$$

Пользуясь (1.2.2), выводим

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \\
&\leq (c_{30} 2^{-\mathfrak{m}(\theta'\beta^{-1}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon))r} r^{\mathfrak{c}(\theta'\beta^{-1}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) - 1)})^{1/\theta'} \\
&= (c_{30} 2^{-\theta'\mathfrak{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)r} r^{\mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) - 1})^{1/\theta'} \\
&= c_{31} 2^{-\mathfrak{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)r} r^{(1-1/\theta)(\mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) - 1)}, r \in \mathbb{N}.
\end{aligned} \tag{2.2.24}$$

Как показано в [5], существует константа $c_{32}(d, \alpha, p, \theta) > 0$ такая, что для $f \in \mathcal{S}_{p, \theta}^\alpha \mathcal{B}(I^d)$ при $r \in \mathbb{N}$ имеет место неравенство

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} (2^{(\kappa, \alpha)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, c_2(2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)})^\theta \right)^{1/\theta} \leq c_{32}. \tag{2.2.25}$$

Подставляя (2.2.24) и (2.2.25) в (2.2.23), приходим к неравенству

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)} \Omega^{l\chi_{\mathbf{s}(\kappa)}}(f, (c_2 2^{-\kappa})^{\mathbf{s}(\kappa)})_{L_p(I^d)} \\
&\leq c_{33} 2^{-\mathfrak{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)r} r^{(1-1/\theta)(\mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) - 1)}, f \in K, r \in \mathbb{N}.
\end{aligned} \tag{2.2.26}$$

Продолжая оценку правой части (2.2.22), рассмотрим два случая. В первом случае, когда $\theta > p$, для $f \in K, J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq$

$\emptyset, r \in \mathbb{N}$, благодаря неравенству Гёльдера, с учётом (2.2.24) имеем

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \\
& = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \\
& \leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \\
& \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \right. \\
& \quad \times \left. \left. \left(2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{\theta/p} \right)^{1/\theta} \\
& \leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \\
& \quad \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \right. \\
& \quad \times \left. \left. \left(2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{\theta/p} \right)^{1/\theta} \\
& \leq c_{34} 2^{-\mathbf{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) r_{r'} (1 - 1/\theta) (\mathbf{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ + \epsilon) - 1)} \\
& \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \left(2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} \right. \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \left. + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{\theta/p} \right)^{1/\theta}. \quad (2.2.27)
\end{aligned}$$

Оценивая слагаемые в правой части (2.2.27), пользуясь неравенством Гёльдера с показателем $\theta/p > 1$, для $f \in K$ при $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset$

$\mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'$, ВЫВОДИМ

$$\begin{aligned}
& \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \\
& \quad \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p du^J \\
& = \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{\frac{1}{2} p \epsilon_j - (\theta - p)/\theta} \right) \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \frac{1}{2} \epsilon_j) - p/\theta} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \\
& \quad \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p du^J \\
& \leq \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{\frac{1}{2} p \epsilon_j - (\theta - p)/\theta} \right)^{\theta/(\theta - p)} du^J \right)^{(\theta - p)/\theta} \\
& \quad \times \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \frac{1}{2} \epsilon_j) - p/\theta} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \\
& \quad \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p \left. \right)^{\theta/p} du^J \Big)^{p/\theta} \\
& = \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{\frac{1}{2} p \epsilon_j \theta / (\theta - p) - 1} \right) du^J \right)^{(\theta - p)/\theta} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-\theta(\alpha_j - \frac{1}{2} \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \\
& \quad \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta du^J \left. \right)^{p/\theta} \\
& = c_{35} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-\theta(\alpha_j - \frac{1}{2} \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \\
& \quad \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta du^J \left. \right)^{p/\theta}.
\end{aligned} \tag{2.2.28}$$

Из (2.2.28) с учетом замечания после леммы 1.2.1 и теоремы Лебега о предельном переходе под знаком интеграла вытекает, что при $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1$:

$J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset$, для $f \in K$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \right. \\
& \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p du^J \Big)^{\theta/p} \Big)^{1/\theta} \\
& \leq c_{36} \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-\theta(\alpha_j - \frac{1}{2}\epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \\
& \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta du^J \Big)^{1/\theta} \\
& = c_{36} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-\theta(\alpha_j - \frac{1}{2}\epsilon_j) - 1} \right) \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \right. \\
& \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta \Big) du^J \Big)^{1/\theta}. \tag{2.2.29}
\end{aligned}$$

Далее, учитывая, что при $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J', u^J \in (\mathbb{R}_+^d)^J$ для $f \in K$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned}
& (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta \\
& = (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} ((u^{J \setminus J'})^{-\alpha^{J \setminus J'}} (2^{-\kappa^{J'}})^{-\alpha^{J'}} \\
& \times \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta \\
& = (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(u+uI^d)^{J \setminus J'} \times (2^{-\kappa} + 2^{-\kappa} I^d)^{J'}} (u^{J \setminus J'})^{-\epsilon^{J \setminus J'} - \theta \alpha^{J \setminus J'}} (2^{-\kappa^{J'}})^{-\epsilon^{J'} - \theta \alpha^{J'}} \\
& \times (\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta d\tau^{J \cup J'}) \\
& \leq c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(u+uI^d)^{J \setminus J'} \times (2^{-\kappa} + 2^{-\kappa} I^d)^{J'}} (\tau^{J \setminus J'})^{-\epsilon^{J \setminus J'} - \theta \alpha^{J \setminus J'}} (\tau^{J'})^{-\epsilon^{J'} - \theta \alpha^{J'}} \\
& \times (\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (\tau \chi_{J \setminus J'} + \tau u \chi_{J' \cap J} + c_2 \tau \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta d\tau^{J \cup J'}) \\
& \leq c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \setminus J'} \times (2^{-\kappa} + 2^{-\kappa} I^d)^{J'}} (\tau^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \times (\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (\tau \chi_{J \setminus J'} + \tau u \chi_{J' \cap J} + c_2 \tau \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta d\tau^{J \cup J'}),
\end{aligned}$$

заклучаем, что

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (u\chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u\chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^\theta \\
& \leq c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \setminus J'} \times (2^{-\kappa} + 2^{-\kappa} I^d)^{J'}} (\tau^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (\tau\chi_{J \setminus J'} + \tau u\chi_{J' \cap J} + c_2 \tau\chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta d\tau^{J \cup J'} \\
& = c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{\bigcup_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} (\mathbb{R}_+^d)^{J \setminus J'} \times (2^{-\kappa} + 2^{-\kappa} I^d)^{J'}} (\tau^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (\tau\chi_{J \setminus J'} + \tau u\chi_{J' \cap J} + c_2 \tau\chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta d\tau^{J \cup J'} \\
& = c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \setminus J'} \times (I^d)^{J'}} (\tau^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (\tau\chi_{J \setminus J'} + \tau u\chi_{J' \cap J} + c_2 \tau\chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta d\tau^{J \cup J'} \\
& \leq c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \cup J'}} (\tau^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, (\tau\chi_{J \setminus J'} + \tau u\chi_{J' \cap J} + c_2 \tau\chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta d\tau^{J \cup J'} \\
& = c_{37} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \cup J'}} \left(\prod_{j \in (J \setminus J')} t_j^{-1 - \theta \alpha_j} \right) \left(\prod_{j \in (J \cap J')} (t_j / u_j)^{-1 - \theta \alpha_j} \right) \\
& \quad \times \left(\prod_{j \in (J' \setminus J)} (t_j / c_2)^{-1 - \theta \alpha_j} \right) (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, t^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta \left(\prod_{j \in (J \cap J')} (1 / u_j) \right) \left(\prod_{j \in (J' \setminus J)} (1 / c_2) \right) dt^{J \cup J'} \\
& = c_{38} (u^{J \setminus J'})^{\theta \alpha^{J \setminus J'}} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \cup J'}} \left(\prod_{j \in (J \cap J')} u_j^{\theta \alpha_j} \right) (t^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, t^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta dt^{J \cup J'} = c_{38} (u^J)^{\theta \alpha^J} \int_{(\mathbb{R}_+^d)^{J \cup J'}} (t^{J \cup J'})^{-\epsilon^{J \cup J'} - \theta \alpha^{J \cup J'}} \\
& \quad \times (\Omega^{l\chi_{J \cup J'}}(f, t^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta dt^{J \cup J'} \leq c_{38} (u^J)^{\theta \alpha^J}. \quad (2.2.30)
\end{aligned}$$

Подставляя оценку (2.2.30) в (2.2.29), находим, что

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})}) \right. \right. \\
& \times \left. \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p du^J \right)^{\theta/p} \right)^{1/\theta} \\
& \leq c_{36} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-\theta(\alpha_j - \frac{1}{2}\epsilon_j) - 1} \right) c_{38} (u^J)^{\theta \alpha^J} du^J \right)^{1/\theta} \\
& = c_{39} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} (u^J)^{\frac{1}{2}\theta \epsilon^J - \epsilon^J} du^J \right)^{1/\theta} = c_{40}, \\
& J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, f \in K. \quad (2.2.31)
\end{aligned}$$

Соединяя (2.2.27) с (2.2.31), приходим к неравенству

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \times \left. \left(\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)}^p du^J \right)^{1/p} \right. \\
& \leq c_{41} 2^{-\mathbf{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r_p (1 - 1/\theta)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)}, \\
& f \in K, r \in \mathbb{N}, J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset. \quad (2.2.32)
\end{aligned}$$

После подстановки (2.2.26) и (2.2.32) в (2.2.22) получаем, что для $f \in K$ и $r \in \mathbb{N}$, удовлетворяющего (2.2.21), при $\theta > p$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\lambda f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(I^d)} \\
& \leq c_{42} 2^{-\mathbf{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r_p (1 - 1/\theta)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)}. \quad (2.2.33)
\end{aligned}$$

Проводя оценку правой части (2.2.22) в случае, когда $\theta \leq p$, для $f \in K, J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, r \in \mathbb{N}$, благодаря неравенству Гёльдера, ввиду (2.2.24) с заменой в нём θ на p , а также используя с учетом замечания после леммы 1.2.1 теорему Лебега о предельном переходе

под знаком интеграла, выводим

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \left(\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \right)^{1/p} \\
& = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right. \\
& \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \Big)^{1/p} \\
& \leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) p'} \right)^{1/p'} \\
& \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, \mathbf{s}(\kappa) = J'} \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right. \\
& \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \Big)^{1/p} \\
& \leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r} 2^{-(\kappa, \alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) p'} \right)^{1/p'} \\
& \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right. \\
& \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \Big)^{1/p} \\
& \leq c_{43} 2^{-\mathbf{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) r_{\mathcal{T}} (1 - 1/p) (\mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) - 1)} \\
& \quad \times \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} \int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right. \\
& \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \Big)^{1/p} \\
& = c_{43} 2^{-\mathbf{m}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) r_{\mathcal{T}} (1 - 1/p) (\mathfrak{c}(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) - 1)} \\
& \quad \times \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{s}(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right) \right. \\
& \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u \chi_{J \setminus J'} + 2^{-\kappa} u \chi_{J' \cap J} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)} \right)^p du^J \Big)^{1/p}.
\end{aligned}$$

(2.2.34)

Применяя неравенство Гёльдера с показателем $\theta/p \leq 1$, а также неравенство (2.2.30), для $f \in K, J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, u^J \in (\mathbb{R}_+^d)^J$ имеем

$$\begin{aligned} & \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : s(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u_{\chi_{J \setminus J'}} + 2^{-\kappa} u_{\chi_{J' \cap J}} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^p \\ & \leq \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : s(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u_{\chi_{J \setminus J'}} + 2^{-\kappa} u_{\chi_{J' \cap J}} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^\theta \right)^{p/\theta} \\ & \leq (c_{38} (u^J)^{\theta \alpha^J})^{p/\theta} = c_{44} (u^J)^{p \alpha^J}. \quad (2.2.35) \end{aligned}$$

Из (2.2.35) вытекает, что при $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, \theta \leq p$, для $f \in K$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} & \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \left(\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : s(\kappa) = J'} (2^{(\kappa^{J'}, \alpha^{J'})} \right. \right. \\ & \quad \times \left. \Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u_{\chi_{J \setminus J'}} + 2^{-\kappa} u_{\chi_{J' \cap J}} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^p \left. du^J \right) \right)^{1/p} \\ & \leq \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) c_{44} (u^J)^{p \alpha^J} du^J \right)^{1/p} \\ & = c_{45} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} (u^J)^{p \epsilon^J - \epsilon^J} du^J \right)^{1/p} = c_{46}. \quad (2.2.36) \end{aligned}$$

Подставляя оценку (2.2.36) в (2.2.34), находим, что для $f \in K, \theta \leq p$, при $J \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J \neq \emptyset, J' \subset \mathcal{N}_{1,d}^1 : J' \neq \emptyset, r \in \mathbb{N}$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned} & \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}_+^d : (\kappa, \beta) > r, s(\kappa) = J'} 2^{(\kappa, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \left(\int_{(c_3 I^d)^J} \left(\prod_{j \in J} u_j^{-p(\alpha_j - \epsilon_j) - 1} \right) \right. \\ & \quad \times \left. \left(\Omega^{l_{\chi_{J \cup J'}}}(f, (u_{\chi_{J \setminus J'}} + 2^{-\kappa} u_{\chi_{J' \cap J}} + c_2 2^{-\kappa} \chi_{J' \setminus J})^{J \cup J'})_{L_p(I^d)})^p du^J \right) \right)^{1/p} \\ & \leq c_{47} 2^{-m(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r} r^{(1-1/p)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)}. \quad (2.2.37) \end{aligned}$$

Соединяя (2.2.26) и (2.2.37) с (2.2.22), получаем, что для $f \in K$ и $r \in \mathbb{N}$, удовлетворяющего (2.2.21), при $\theta \leq p$ справедливо неравенство

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(I^d)} & \leq c_{48} 2^{-m(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r} r^{(1-1/\theta)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)} \\ & \quad + c_{49} 2^{-m(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r} r^{(1-1/p)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)} \\ & \leq c_{50} 2^{-m(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) r} r^{(1-1/p)(\epsilon(\alpha - \lambda - (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1)}. \quad (2.2.38) \end{aligned}$$

Из (2.2.33), (2.2.38), (2.2.21) следует (2.2.20). $\square$ Отметим, что в проведенном доказательстве всюду при выводе соотношений, содержащих ряды, неявно утверждается, что "если правая часть выводимого соотношения определена, то левая его часть также определена и справедливо выводимое соотношение".

Список литературы

- [1] Кудрявцев С. Н. Восстановление функций вместе с их производными по значениям функций в заданном числе точек // Изв. РАН. Сер. матем. 58:6 (1994), 79 - 104.
- [2] Кудрявцев С. Н. Наилучшая точность восстановления функций конечной гладкости по их значениям в заданном числе точек // Изв. РАН. Сер. матем. 62:1 (1998), 21 - 58.
- [3] Кудрявцев С. Н. Приближение производных функций конечной гладкости из неизотропных классов // Изв. РАН. Сер. матем. 68:1 (2004), 79 - 122.
- [4] Кудрявцев С. Н. Приближение и восстановление производных для функций, удовлетворяющих смешанным условиям Гельдера // Изв. РАН. Сер. матем. 71:5 (2007), 37 - 80.
- [5] Кудрявцев С. Н. Обобщённые ряды Хаара и их применение // Analysis Mathematica, 37:2 (2011), 103 - 150.
- [6] Никольский С. М. Функции с доминирующей смешанной производной, удовлетворяющей кратному условию Гельдера // Сибирский математический журнал. 4:6 (1963), 1342 - 1364.
- [7] Аманов Т. И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной // Издательство "Наука" КазССР. Алма-Ата. 1976.
- [8] Галеев Э. М. Порядковые оценки производных периодического многомерного А-ядра Дирихле в смешанной норме // Матем. сб., 117(159):1 (1982), 32-43.